
FAVOR DE LEER AL MENOS 1 SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Detalles de la cita:

*****PARA CANCELAR O REPROGRAMAR LA CITA POR FAVOR LLAME AL 864-232-7338 POR LO MENOS 5 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROCEDIMIENTO PARA EVITAR UN CARGO DE \$250 POR UNA CANCELACIÓN TARDÍA O POR PERDER LA CITA.**

UN CONDUCTOR ADULTO (DE 18 AÑOS O MAYOR) DEBE ACOMPAÑARLE. SU CONDUCTOR DEBE QUEDARSE EN LA INSTALACIÓN O ES POSIBLE QUE REPROGRAMEN EL PROCEDIMIENTO.

TRES (3) DIAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO HAY QUE EVITAR SEMILLAS, NUECES, MAÍZ Y PALOMITAS DE MAÍZ.

INSTRUCCIONES PARA LOS MEDICAMENTOS

- El día antes del procedimiento (el día de preparación): Puede continuar todos los medicamentos diarios, incluyendo la aspirina. **NO DEJE DE TOMAR LA ASPIRINA.**
- El día del procedimiento: Tome la aspirina y los medicamentos para la presión arterial, para el corazón (menos los anticoagulantes), para la tiroides y para las convulsiones con una pequeña cantidad de agua. Suspnda todos los demás medicamentos hasta después del procedimiento.
- Si es diabético, tome la mitad de la dosis de su medicamento para la diabetes o la insulina en el día de preparación. El día del procedimiento no tome su medicamento para diabetes o insulina, pero tráigalo al procedimiento.
- Si toma suplementos de hierro, deje de tomarlos 5 días antes del procedimiento.
- Si tiene asma u otras afecciones pulmonares, traiga sus inhaladores al procedimiento.
- Los medicamentos dietéticos (Adipex, Lomaira, Qsymia, fentermina, etc.) deben suspenderse una semana antes del procedimiento. El medicamento GOLO Release debe suspenderse dos semanas antes del procedimiento.

Instrucciones de la preparación:

Hay que estar en una dieta de líquidos transparentes durante las 24 horas antes del procedimiento.

HAY QUE ESTAR EN UNA DIETA DE LÍQUIDOS TRANSPARENTES HASTA 4 HORAS ANTES DE LA HORA DEL PROCEDIMIENTO. NO SE PUEDE CONSUMIR NADA DESPUES DE ESTE TIEMPO, INCLUYENDO AGUA, CHICLE Y CAMELOS DUROS.

Los alimentos y bebidas que se toma antes de la anestesia pueden causar problemas como asfixia o vómitos. Cuando esta sedado, los reflejos protectores de las vías respiratorias de su cuerpo están afectados. Tener alimentos o líquidos en el estómago en cualquier cantidad aumenta en gran medida la posibilidad de consecuencias graves.

OPCIONES PARA LA DIETA DE LÍQUIDOS TRANSPARENTES: (EVITE LÍQUIDOS ROJOS, AZULES Y MORADOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS)

- Sopas: Cubitos de caldo (NO caldo regular)
- Postres: gelatina, paletas heladas (sin rojo, azul o morado)
- Bebidas: café (negro o solo con azúcar, NO lácteos ni cremas artificiales), te, jugo de manzana, jugo de uva blanca. Bebidas carbonatadas: Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Sprite, Ginger Ale. Bebidas deportivas: Gatorade, G2, Powerade

Los mareos y el dolor de cabeza pueden ser signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre. Beber una bebida carbonatada regular (no dietética) o jugo de manzana puede aliviar estos síntomas.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Puedo masticar chicle o comer caramelos? Sí, pero nada con centros blandos o de color rojo. No mastique chicle ni caramelos 4 horas antes del procedimiento.
2. ¿Puedo cepillarme los dientes? Sí.
3. ¿Puedo llevar mi dentadura postiza? Sí, puede llevarla al procedimiento, pero es posible que se le pida que se la quite antes del procedimiento.
4. Quítese todas las joyas antes del procedimiento.